

	2 pistettä	1 pistettä	0 pistettä	Pisteet
Trombosytopenia	Tromb lasku > 50 %, alin lukema tromb $\geq 20 \times 10^9/l$	Tromb lasku 30 - 50 % tai alin lukema tromb 10 - $19 \times 10^9/l$	Tromb lasku < 30 % tai alin lukema < $10 \times 10^9/l$	
Trombosytopenian ajoittuminen	5 - 10 vrk kuluessa tai ≤ 1 vrk (jos altistunut hepariinille viim. 30 vrk aikana)	> 10 vrk tai ajoitus epäselvä tai ≤ 1 vrk (jos altistunut hepariinille viim. 31 - 100 vrk aikana)	< 4 vrk hoidon aloittamisesta (ei äskettäistä hepariinille altistumista)	
Tromboosi tai muu komplikaatio	Uusi tromboosi, ihonekroosi tai hepariiniboluksen jälkeinen akuutti systeeminen reaktio	Etenevä tai uusiutunut tromboosi, punoittavat iholeesiot tai tromboosiepäily - ei vahvistettu	Ei mitään	
Trombosytopenian muut syyt	Ei muuta ilmeistä syytä trombosytopenialle	Muu syy mahdollinen	Muu syy olemassa	
			Pisteet yhteensä	

HIT-riskin laskusääntö: 0 - 3 pistettä = pieni riski, 4 - 5 pistettä = kohtalainen riski; 6 - 8 pistettä = suuri riski.

Kyseessä on ns. 4T-laskuri, jota käytetään arvioitaessa hepariinin indusoiman trombosytopenian eli HIT:n todennäköisyyttä. 4T-pisteytys perustuu julkaisuun [Lo GK ym. J Thromb Haemost 2006;4\(4\):759-65](#)

HIT-laskuriin liittyviin kysymyksiin vastaavat Diagnostiikkakeskuksen lääkärit Tuukka Helin tai Janne Suvisaari (sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@hus.fi).