

Lyhenne	Pitkä nimi	Kommentti (Diagnostiikkakeskus)	Lyhenne käytössä koodistopalvelimella
<b>aB-</b>	valtimoveri		x
<b>Af-</b>	punktioneste		x
<b>Am-</b>	lapsivesi		x
<b>As-</b>	askitesneste		x
<b>B -</b>	veri		x
<b>Bf-</b>	keuhkoputkilima		x
<b>Bi-</b>	sappi		x
<b>Bl-</b>	bronkoalveolaarihuuhtelu		x
<b>Bm-</b>	luuydin		x
<b>Bo-</b>	luu		x
<b>Br-</b>	rinnan	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksella Br-PAD-4	
<b>cB-</b>	kapillaariveri		x
<b>Cn-</b>	keskushermosto		x
<b>cU-</b>	keräysvirtsa		x
<b>Cv-</b>	(sikiön) suonikalvon nukkalisäke		x
<b>Di-</b>	dialyysineste		x
<b>dU-</b>	vuorokausivirtsa		x
<b>E -</b>	erytrosyytti, punasolu		x
<b>Ex-</b>	yskös		x
<b>F -</b>	uloste		x
<b>fB-</b>	vierasesine tai implantti		x
<b>fB-</b>	paastoveri		
<b>FI-</b>	emätinerite		x
<b>fP-</b>	paastoplasma		x
<b>fS-</b>	paastoseerumi		x
<b>Gi-</b>	suolikanava		x
<b>He-</b>	sydän		x
<b>Ki-</b>	munuainen		x
<b>Ks-</b>	kantasolu	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksella Ks-SoluVi	
<b>L -</b>	leukosyytti, valkosolu		x
<b>La-</b>	leukafereesinäytteestä	Ei vakiintunut, käytössä tutkimuksilla La-CD34-ks, La-Leuk, La-PVK, La-Start ja La-Tuote	
<b>Li-</b>	aivo-selkäydinneste		x
<b>Ln-</b>	imusolmuke		x
<b>Lr-</b>	maksa		x
<b>Lu-</b>	keuhko		x
<b>Ly-</b>	lymfosyytti		x
<b>M -</b>	lihás		x

Lyhenne	Pitkä nimi	Kommentti (Diagnostiikkakeskus)	Lyhenne käytössä koodistopalvelimella
<b>mB-</b>	sekoittunut laskimoveri		
<b>Me-</b>	lapsenpihka		x
<b>Ne-</b>	hermo		x
<b>nU-</b>	yövirtsa (aamuvirtsa)		x
<b>P -</b>	plasma		x
<b>Pd-</b>	vatsaontelon dialyysineste		x
<b>Pf-</b>	pleuraneste		x
<b>PI-</b>	istukka		x
<b>Pp-</b>	ientasku		x
<b>Ps-</b>	nieluerite		x
<b>Pt-</b>	potilas		x
<b>Pu-</b>	märkä		x
<b>S -</b>	seerumi		x
<b>Sa-</b>	sylki		x
<b>Sc-</b>	kantasolu	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksella Sc-Kromos	
<b>Se-</b>	erite		x
<b>Sk-</b>	iho		x
<b>Sw-</b>	hiki		x
<b>Sy-</b>	nivelneste		x
<b>Ts-</b>	kudosnäyte		x
<b>U -</b>	virtsanäyte		x
<b>uA-</b>	napavaltimoveri		x
<b>uB-</b>	napaveri		x
<b>uE-</b>	napaveren erytrosyyttien	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksilla uE-Retik ja uE-Reti-pu	
<b>Ug-</b>	urogenitaali		
<b>uP-</b>	napaveren plasma	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksilla uP-FIX ja uP-FVIII	
<b>uS-</b>	napaseerumi		x
<b>uV-</b>	napalaskimoveri		x
<b>vB-</b>	laskimoveri		x
<b>Ym-</b>	ympäristönäyte	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksilla Ym-All, Ym-All3Ag, Ym-All5Ag ja Ym-MuuAll	
<b>zB-</b>	keskuslaskimoveri		x (sentraaliveri)
<b>zS-</b>	keskuslaskimoveren seerumi	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksella zS-BioL	