

**Vuoto-oiretaulukko**

Täytetään vuototaipumusta selvitetäessä

	0 pistettä	1 pistettä	2 pistettä	3 pistettä	4 pistettä	Pisteet
<b>Nenäverenvuodot</b>	Ei ollenkaan tai merkityksettömän harvoin (< 5 x /v) tai vain toisesta sieraimesta	> 5 x / v tai kerrallaan > 10 min		Tamponointi muu paikallishoito ja/tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini	
<b>Mustelmataipumus</b>	Ei ollenkaan tai merkityksettömän pieniä (< 1 cm)	> 1 cm vartalon alueella spontaanisti	Yhteydenotto lääkäriin	Tummia suuria (> 5 cm) ja resistenssi		
<b>Vuodot pienistä haavoista</b>	Ei ollenkaan tai merkityksettömän harvoin	Usein tai kerrallaan > 5 min kesto	Yhteydenotto lääkäriin	Kirurginen vuodon tyrehtyttäminen ja/tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini	
<b>Ien- ja suunlimakalvo- vuodot</b>	Ei	Harvoin	Usein tai spontaanisti, yhteydenotto lääkäriin	Kirurginen vuodon tyrehtyttäminen ja/tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini	
<b>Vuoto hampaanpoiston jälkeen</b>	Ei poistoja tai ei vuotoa 1 poiston yhteydessä	Lisääntynyt/pitkitynyt vuoto 1 leikkauksen jälkeen. Hakeutuminen hoitoon	Lisääntynyt vuoto 2 poiston jälkeen. Hakeutuminen hoitoon	(Uudelleen) ompelu, tamponointi ja/tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini	
<b>GI-kanavan vuodot</b>	Ei	Paikallisesta syystä johtuva	Spontaani	Kirurginen vuodon tyrehtyttäminen ja/tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini	
<b>Leikkausvuodot</b>	Ei leikkauksia tai ei vuotoa 1 leikkauksen yhteydessä	Lisääntynyt/pitkitynyt vuoto 1 leikkauksen jälkeen. Hakeutuminen hoitoon	Lisääntynyt vuoto 2 poiston jälkeen. Hakeutuminen hoitoon	Kirurginen vuodon tyrehtyttäminen ja/tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini	
<b>Lihassetä verenvuodot</b>	Ei koskaan	Vamman jälkeen, ei toimenpiteitä	Spontaani, ei toimenpiteitä		Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini ja/tai kirurginen hoito	
<b>Nivelverenvuodot</b>	Ei koskaan	Vamman jälkeen, ei toimenpiteitä	Spontaani, ei toimenpiteitä		Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini ja/tai kirurginen hoito	
<b>Keskushermostovuodot</b>	Ei koskaan		Trauman tai muun selittävän syyn yhteydessä		Spontaani	
<b>NAISILLE</b> <b>Runsaat kuukautiset &gt; 7 päivää, kuukautissuoja vaihto usein/öisin</b>	Ei	Yhteydenotto lääkäriin	Antifibrinolyttinen hoito, rautalääkitys, hormonivalmiste	Kaavinta tai muu paikallistoimenpide	Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini, hysterektomia	
<b>Poikkeava synnytyksen jälkivuoto</b>	Ei synnytystä tai ei vuotoa synnytyksen yhteydessä	Yhteydenotto lääkäriin	Kaavinta tai muu paikallistoimenpide, antifibrinolyttinen hoito		Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini, hysterektomia	
					<b>Pisteet yhteensä</b>	

Vuoto-oireiden kokonaisvaltainen selvittely auttaa arvioimaan verenvuototaipumuksen vaikeusastetta (ISTH, bleeding score). Laskuri perustuu julkaisuun [Rodeghiero F ym. J Thromb Haemost 2010;8:2063-5](https://doi.org/10.1177/0962280210382063)

Vuoto-oiretaulukkoon liittyviin kysymyksiin vastaavat Diagnostiikkakeskuksen lääkärit Tuukka Helin tai Janne Suvisaari (sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@hus.fi).